

Anno 2018

A livello nazionale anno 2017:

consumo antibiotici nelle strutture sanitarie: 2,1 DDD*1000 ab die


In convenzionata: 19,7 DDD*1000 ab die con trend in diminuzione (-2,2%) vs anno 2016




Tipo Flusso	DDD Pezzi	DDD*1000 ab/die	Trattati
Farmaceutica Territoriale - Convenzionata	2.400.561	13,23	149.708
Farmaceutica Territoriale - Primo Ciclo di Terapia	63.107	0,35	4.368
Farmaceutica Territoriale - Erogazione Diretta	16.018	0,09	348
Farmaceutica Territoriale - Assistenza Domiciliare Integrata	6.318	0,03	289
Farmaceutica Territoriale - Residenza Sanitaria Assistenziale	782	0,00	64
totale	2.486.785	13,70	

Tipo Medico	Trattati	ddd*1000 ab/die	Prevalenza
Pazienti senza scelta medico	980	3,53	10,76
MMG	133.268	14,18	31,07
PLS	18.055	11,72	30,17
Totale	151.847	13,69	30,50


QUALI ANTIBIOTICI?



MMG




PLS




INDICATORI di QUALITA'
European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

INDICATORI ESAC DI QUALITA': VARIAZIONE STAGIONALE DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI SISTEMICI

ANTIBIOTICI SISTEMICI (J01) - ddd/1000 AB DIE



INDICATORI ESAC DI QUALITA': VARIAZIONE STAGIONALE DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI CHINOLONI



**INDICATORI ESAC DI QUALITA': INCIDENZA % SUL TOTALE DEGLI
ANTIBIOTICI DEI CONSUMI (DDD) PER SPECIFICI GRUPPI DI ANTIBIOTICI
ANNO 2018 - CONVENZIONATA**


	ASSOCIAZIONE DI PENICILLINE INCLUSI INIBITORI BETA- LATTAMICI %	CEFALOSPORINE DI III-IV GENERAZIONE %	FLUROCHINOLONI %
VENETO	42,70	7,10	14,40
AULSS 8	49,38	8,37	16,54

SPESA NETTA ANNO 2018

ATC I Livello	Spesa Netta
C - SISTEMA CARDIOVASCOLARE	15.872.752
N - SISTEMA NERVOSO	8.483.257
A - APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO	8.317.244
R - SISTEMA RESPIRATORIO	5.053.958
J - ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO	2.407.353
L - FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI	1.715.219
B - SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI	1.616.541
G - SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI	1.555.273
S - ORGANI DI SENSO	1.264.381
M - SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO	1.118.707
H - PREPARATI ORMONALI SISTEMICI,ESCL.ORMONI SESSUALI E INSULINE	1.027.271
D - DERMATOLOGICI	329.095
P - FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI...	119.924
V - VARI	47.389
TOTALE	48.928.364


SPESA NETTA ANNO 2018

- C - SISTEMA CARDIOVASCOLARE
- N - SISTEMA NERVOSO
- A - APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO
- R - SISTEMA RESPIRATORIO
- J - ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO
- L - FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI
- B - SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI
- G - SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI
- S - ORGANI DI SENSO
- M - SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO
- H - PREPARATI ORMONALI SISTEMICI,ESCL.ORMONI SESSUALI E INSULINE
- D - DERMATOLOGICI
- P - FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI
- V - VARI




DIVERSI STILI PRESCRITTIVI....

J01 - ANTIBIOTICI



DIVERSI STILI PRESCRITTIVI....



OBIETTIVO DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Azienda Sanitaria	6. Riduzione del consumo di antibiotici sistemici > 10% in ambito territoriale rispetto al 2016
504. Veneto Orientale	-7,00%
501. Dolomiti	-5,90%
505. Polesana	-4,30%
509. Scaligera	-1,40%
508. Berica	-0,50%
506. Euganea	0,40%
503. Serenissima	0,60%
502. Marca Trevigiana	2,20%
507. Pedemontana	10,10%

NON DIMENTICHIAMO LE ADR

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA
CON LE AUTORITA' REGOLATORIE EUROPEE E
L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)**

Aprile 2019

Antibiotici chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e inalatorio

Rischio di effetti indesiderati invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti e restrizioni d'uso

- reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti, principalmente a **carico del sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso**.
- I medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico sono stati ritirati dal commercio.
- **Non** prescrivere questi medicinali:
 - per il trattamento di infezioni non gravi o autolimitanti (quali faringite, tonsillite e bronchite acuta);
 - per la prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie inferiori;
 - per infezioni non batteriche, per esempio la prostatite non batterica (cronica);
 - per le infezioni da lievi a moderate (incluse la cistite non complicata, l'esacerbazione acuta della bronchite cronica e della broncopneumopatia cronica ostruttiva – BPCO, la rinosinusite batterica acuta e l'otite media acuta), a meno che altri antibiotici comunemente raccomandati per queste infezioni siano ritenuti inappropriati ;
 - ai pazienti che in passato abbiano manifestato reazioni avverse gravi ad un antibiotico chinolonico o fluoroquinolonico.

- Prescrivere con **particolare prudenza** agli anziani, ai pazienti con compromissione renale, ai pazienti sottoposti a trapianto d'organo solido ed a quelli trattati contemporaneamente con corticosteroidi, poiché il rischio di tendinite e rottura di tendine indotte dai fluorochinoloni può essere maggiore in questi pazienti. Dev'essere evitato l'uso concomitante di corticosteroidi con fluorochinoloni.
- Informare i pazienti d'**interrompere il trattamento** ai primi segni di reazione avversa grave quale tendinite e rottura del tendine, dolore muscolare, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore articolare, neuropatia periferica ed effetti a carico del sistema nervoso centrale.